

PIOMIOSITE TROPICAL: RELATO DE CASO EM LACTENTE

Thúlio F. B. da Costa*, Olga A. Takano, Lillian S.L. Moraes, Fabiana A. Domiciano, Caroline S. Leal.

Departamento de Pediatria, Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Federal de Mato Grosso.

Introdução: A piomiosite tropical é uma doença infecciosa primária do músculo esquelético, que ocorre principalmente em países tropicais, sendo rara em lactentes e crianças. O agente etiológico responsável por cerca de 90% dos casos é o *Staphylococcus aureus*. O quadro clínico apresenta-se com dor muscular localizada associada à febre. Em casos mais graves pode ocasionar síndrome compartimental, abscessos metastáticos, pneumonia, osteomielite, destruição articular e sepse. O objetivo do trabalho é relatar um caso de piomiosite tropical em lactente.

Metodologia: Revisão de prontuário.

Resultados: JPPC, masculino, 1 ano e 8 meses, natural e procedente de Cuiabá, internou com história de febre há 20 dias, choro, irritabilidade, prejudicando o sono. Evoluiu com nodulações dolorosas em membros em coxa D e panturrilha D, braço D, região lombossacra E. Ex. Físico: Febril, regular estado geral, presença de nódulos dolorosos 8,5 x 8,5 cm nos locais acima descritos. EXAMES: hemograma com leucocitose e desvio à esquerda, VHS elevado, hemocultura e urocultura negativas. Cultura de secreção do abscesso positiva para *S. aureus*. USG de membros superiores e inferiores compatíveis com miosite múltipla e abscessos musculares: presença de coleções hipoeecóicas e heterogêneas no interior das camadas musculares região lateral da coxa D em topografia do m. vasto lateral 5x3x2, 3x3, 1 cm; região posterior da perna E em topografia do m. gastrocnêmico medial 3x7x1,3 cm; braço D em topografia do m. bíceps braquial 3,1x2,7x2,2 cm; na região dorsal E 2,3x1,5,2 cm e 3,4x1x3,2 cm. Evolução: foi feito oxacilina EV e drenagem cirúrgica dos abscessos, evoluindo com melhora do quadro, recebendo alta no 10º dia de internação. Alta com cefalexina oral com bons resultados.

Conclusões: Apesar da piomiosite tropical é uma doença comum na segunda e terceira décadas etárias e poder estar associado com imunodeficiência ou história de trauma, os autores chamam a

atenção para a idade do paciente e para a importância do início precoce do tratamento específico para *S. aureus* evitando a evolução para formas graves.